

## RECOMENDACIONES INTIA OLIVO. CAMPAÑA 2026

### TRATAMIENTOS REPILO (*Spilocaea oleagina*)



Con temperaturas entre 15°C y 20°C, y humedades elevadas son las condiciones óptimas para el desarrollo y dispersión del hongo. Con las abundantes lluvias que se han producido hasta ahora hace recomendable la vigilancia de las parcelas.

En el caso de olivares afectados por la enfermedad se recomienda realizar un tratamiento temprano con un fungicida autorizado con acción curativa (triazoles, estrobirulinas). Realizar el tratamiento en esta época de salida de invierno, previo al tratamiento principal, que se hará en primavera en pre-floración con el objetivo de proteger las hojas nuevas surgidas de la brotación de este año.

**En agricultura ecológica** es importante priorizar los métodos de lucha culturales preventivos;

- Optar en plantaciones nuevas por variedades menos sensibles a repilo,
- Diseñar y orientar las plantaciones para favorecer la ventilación y la formación del árbol,
- Sistemas de poda que favorezcan la aireación e iluminación de la vegetación.

Al realizar tratamientos con fungicidas, autorizados en agricultura ecológica, recordar que son productos con acción por contacto, por lo que habrá que anticipar las aplicaciones a los momentos de riesgo de infección de la enfermedad.

| Materia activa y riqueza %         | Nombre. comercial                 | Dosis Máx      | Observaciones                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azoxistrobin 20+difenoconazol 12,5 | Ortiva Top<br>Amistar top         | 1 l/ha         | 1 aplicación en primavera<br>Hasta prefloración                                                       |
| <i>Bacillus subtilis</i> 1,34      | Serenade Aso                      | 8 l/ha         | 1 a 6 aplicaciones                                                                                    |
| compuestos cupricos (1)            | Varios                            | Varias         | <b>OJO!</b> diferentes condiciones de uso                                                             |
| difenoconazol 25 (2)               | Difenofin<br>Lexus 25<br>Score 25 | 60-(10)cc/hl   | 2 aplicaciones, solo en primavera<br>No superar 0,5 l/ha                                              |
| difenoconazol 25 (2)               | Core                              | 0,6 l/ha       | 1 aplicación en primavera                                                                             |
| dodina 40                          | Dalmata                           | 1,6-2 l/ha     | 1 aplicación a 2 l/ha ó<br>2 aplicaciones a 1,6 l/ha y aplicación<br>Primavera hasta fin de floración |
| dodina 40                          | Syllit flow                       | 1,7-2,25 l/ha  | 2 aplicaciones en primavera o en otoño                                                                |
| dodina 54,4                        | Syllit Max                        | 1,25-1,65 l/ha | 2 aplicaciones en primavera hasta fin de<br>floración o en otoño                                      |



| Materia activa y riqueza %             | Nombre.<br>comercial        | Dosis<br>Máx | Observaciones                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| folpet 30+oxicloruro de cobre 16       | Codimur-F                   | 2,5 kg/ha    | 1 aplicación en primavera hasta prefloración                 |
| fosfonato potásico 51                  | Varios                      | 2,5 l/ha     | 1 aplicación                                                 |
| kresoxim-metil 50                      | Varios                      | 0,2 kg/ha    | 2 aplicaciones antes de inicio de floración.                 |
| kresoxim-metil 50                      | Stroby wg<br>Discus         | 0,2 kg/ha    | 2 aplicaciones, una en prefloración y otra tras la floración |
| kresoxim-metil 25+difenoconazol 12,5   | Spotter WG<br>Flecha Suprem | 0,3 kg/ha    | 2 aplicaciones. Sólo primavera hasta prefloración            |
| piraclostrobin 20                      | Cabrio WG                   | 0,5 kg/ha    | 1 aplicación, hasta inicio engorde de frutos                 |
| tebuconazol 25 y 20                    | Varios                      | 60-75 cc/hl  | 1 aplicación en primavera antes de la floración              |
| tebuconazol 3,6+oxicloruro de cobre 36 | Neptune                     | 250 cc/hl    | 2 aplicaciones, una en prefloración                          |
| tebuconazol 50+trifloxistrobin 25      | Flint Max                   | 0,24 kg/ha   | 1 aplicación en primavera                                    |
| trifloxistrobin 50                     | Flint                       | 10 g/hl      | 2 aplicaciones, máximo una en otoño<br>120 g/ha y aplicación |

Más información: <https://estacionavisos.agrointegra.intiasa.es>