

## RECOMENDACIONES INTIA. CAMPAÑA 2025

# OLIVO: BARRENILLO NEGRO DEL OLIVO (*Hylesinus oleiperda*)



Adulto de barrenillo negro



Corteza rajada color ferruginoso



Estado BBCH 70

Barrenillo de aspecto similar al barrenillo del olivo que pasa casi todo el año en la madera del árbol. En estas fechas se inicia la salida de adultos para reproducirse y realizar la puesta en las nuevas ramas. Su presencia coincide con el estado 70 BBCH del olivo. **Los árboles afectados se debilitan presentando ramas y brotes secos.** En las ramas se ven grietas con machas rojizas que coinciden con las zonas en las que se encuentran las galerías.

El barrenillo negro necesita árboles vivos para desarrollarse, está considerado un parásito primario. Prefiere ramas de diámetro pequeño de 5 a 18 mm, y ramas vivas. Por tanto, las zonas del árbol preferidas son las más cercanas a la copa y exterior del olivo. Antes de realizar el tratamiento hay que observar la presencia de adultos en la parcela y repetirlo a los 15 días con los productos autorizados.

| Materia activa %         | N. Comercial | Dosis      | Nº Apl | Int. | G.Q. | Z.N.T. |
|--------------------------|--------------|------------|--------|------|------|--------|
| lambda cihalotrin 10 (1) | Lamdastar    | 0,075 l/ha | 2      | 10   | 3A   | 50     |

### Exclusivos para barrenillo del olivo (*Phloeotribus scarabeoides*)

|                     |                          |            |   |    |    |        |
|---------------------|--------------------------|------------|---|----|----|--------|
| deltametrin 2,5     | Ritmus, Delta EC, Audace | 0,5 l/ha   | 3 | 14 | 3A | --     |
| deltametrin 2,5 (2) | Deltaplan, Decis         | 0,03-0,05% | 1 | -- | 3A | 30     |
| deltametrin 2,5 (3) | Deltagri, Scatto         | 0,05%      | 1 | -- | 3A | 20-10* |
| deltametrin 2,5 (1) | Super Delta              | 50 ml/HI   | 2 | 14 | 3A | 10     |

Notas: Nº Apl número aplicaciones máximas por campaña Inter Intervalo entre aplicaciones G.Q. Grupo Químico. Z.N.T. Zona No Tratada al agua (Spe 3) distancia en metros a los cauces de agua, (\*) con boquillas de reducción de deriva (2) Aplicar en bandas con volumen de caldo de 20 l/ha (3) Volumen de caldo 1000-1400 l/ha y dosis máxima 700 ml/ha (1) Volumen de caldo de 1000 l/ha

Más información: <https://estacionavisos.agrointegra.intiasa.es>

## POLILLA DEL OLIVO GENERACION CARPÓFAGA ZONA SUR



Orificio de salida de generación carpófaga de prays



Cuajado

En la **zona sur de Navarra** va avanzando el vuelo de los adultos de polilla del olivo con cuyas puestas comienza la generación carpófaga de la plaga. Las temperaturas de este mes de junio están haciendo que el vuelo esté siendo escalonado, pero los niveles son altos y el cultivo se encuentra en un momento sensible para poder ser afectado.

Estos adultos realizan las puestas sobre los frutos recién formados, normalmente en la zona de inserción con el cáliz. Tras la eclosión, las orugas penetran en el interior del fruto, dirigiéndose hacia la semilla de la que se alimentan durante todo el verano. Una vez llegadas a su máximo desarrollo, las orugas salen por el mismo orificio de penetración, provocando la caída de la aceituna a mediados o finales de septiembre.

Listado de productos autorizados para su empleo en esta generación

| Materia activa %            | N. comercial   | Dosis            | Nº Apl | Inter | G.Q. | Z.N.T. |
|-----------------------------|----------------|------------------|--------|-------|------|--------|
| <b>b. thuringiensis (1)</b> | Varios         | ----             | ----   | --    | 11A  | 5      |
| acetamiprid-20              | Epik           | 0,25 kg/ha       | 2      | 14    | 4A   | 40     |
| spinetoram 25               | Delegate       | 0,05-0,1 kg/ha   | 2      | 28    | 5    | 20     |
| <b>Piretroides</b>          |                |                  |        |       |      |        |
| cyantraniliprol (2)         | Exirel         | 0,2 - 0,35 l/ha  | 2      | 7     | 28   | 10     |
| deltametrin 2,5 (3)         | Varios         | Varias           | --     | --    | 3A   | 30     |
| deltametrin 10              | Decis expert   | 0,075-0,125 l/ha | 1      | --    | 3A   | 10     |
| lambda cihalotrin 1,5       | KarateZeon+1,5 | 1,3 l/ha         | 1      | --    | 3A   | 40/10* |
| lambda cihalotrin 1,5       | Karate 1,5 CS  | (4)              | 2      | 14    | 3A   | 30     |
| lambda cihalotrin 5         | Kaiso Sorbie   | 0,15 kg/ha       | 1      | --    | 3A   | 30*    |
| lambda cihalotrin 10        | Lambdastar     | 0,11 l/ha        | 2      | 10    | 3A   | 50     |

Notas: Nº Apl número aplicaciones máximas por campaña Inter Intervalo entre aplicaciones G.Q. Grupo Químico. Z.N.T. Zona No Tratada al agua (Spe 3) distancia en metros a los cauces de agua, (\*) con boquillas de reducción de deriva (1) En Agricultura Ecológica (2) Aplicar durante BBCH 50-81 (3) Decis, Deltaplan, SuperDelta, Delta EC, Decis Evo, Deltagri, Ritmus, Scatto (atención al número de aplicaciones/campaña) (4) dosis de 0,035 l/hl con volumen de caldo de 2000 l/ha o dosis de 0,07 l/hl con volumen de 1400 l/ha. Delegate fin de uso el 01/10/2025

Más información: <https://estacionavisos.agrointegra.intiasa.es>