



## RECOMENDACIONES INTIA. CAMPAÑA 2026

### BARRENILLO DEL OLIVO (*Phloeotribus scarabeoides*)



Plaga muy extendida en este cultivo, sus daños pueden llegar a ser importantes en los olivares de Navarra. La técnica de lucha más importante y sencilla consiste en dejar una parte de la madera proveniente de la poda en pequeñas pilas en la misma parcela.

Esta madera en proceso de secado actúa como trampa cebo y deberá destruirse una vez finalizada la fase de entrada de adultos y antes de que aparezca la nueva generación de barrenillos adultos.

Los seguimientos semanales realizados a través de la Estación de Avisos indican que las entradas de barrenillo en la madera han finalizado, por lo que ya se puede iniciar la destrucción de las ramas para evitar la emergencia o salida de los nuevos adultos. Estos entrarían en las ramas finas del árbol y provocarían el secado de las mismas.

La destrucción puede realizarse mediante picado fino de los restos o quema si se optó por pequeños montones de madera.

Esta medida es muy importante para controlar el avance de la plaga en las parcelas y **se recomienda realizar el picado fino o quema hasta finales de mayo.**

**NOTA:** AUTORIZADO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS en la Orden Foral 237/2017

Más información: <https://estacionavisos.agrointegra.intiasa.es>