

RECOMENDACIONES INTIA. CAMPAÑA 2026

MOSCA DEL OLIVO

(*Bactrocera oleae*)

Ladera Montejurra orientaciones SUR



El desarrollo óptimo de la mosca de la aceituna se produce cuando dispone de algo de humedad y temperaturas entre 20 y 30°C.

En esta zona las capturas y los daños producidos por la mosca han ido en continuo ascenso desde mediados del mes de julio.

Por tanto y **SOLO EN ESTA ZONA** se recomienda la realización de un tratamiento total en las parcelas de variedades **ARRONIZ, NEGRAL/GORDAL y EMPLÉTRE**.

Se recuerda que los daños pueden ser muy variables de unas parcelas a otras, por lo que se recomienda **realizar observaciones** en cada parcela con el fin de evaluar el índice de daños y decidir si se trata o no. Se muestrearán entre 500 y 1.000 frutos a razón de 25-50 frutos por árbol. **A partir del 5% de aceitunas picadas se recomienda el tratamiento total de la parcela.**

Insecticidas aconsejados indicando los plazos de seguridad de cada uno de ellos. Se recuerda que es importante utilizar los piretroides de forma moderada ya que además de resistencias, aumentan los problemas de acariosis en las parcelas.

Materia activa %	N. comercial	Dosis producto	Vol Caldo l/ha	Nº A	PS	G.Q.	Z.N.T
acetamiprid 20	Epik	0,3 kg/ha	450	2	28	4A	40
acetamiprid 20	Acemur SP	0,3 kg/ha	500-100	1	28	4A	20*
b. bassiana 2,3 (1)	Naturalis L	1-2 l/ha	800-1600	3-5	NP	UNF	5
caolín 95 (1)	Surround WP	30 kg/ha		1	NP		5
caolín 99 (1)	Argical pro	30 kg/ha	500-1000	6	28		5
cipermetrin 5	Cythrín 50 EC	0,8-1,0 l/ha	800-1200	2	3	3	50/20*
deltametrín 1,57	Meteor	0,08-0,09%		3	7	3	20/10*
deltametrín 2,5	Varias - consultar	0,03-0,05 %		3	7	3	**
flupiradifurona 20	Sivanto Prime	0,5-0,75 l/ha	800-100	1	14	4D	20
I-cihalotrin 1,5	KarateZeon+1,5 CS	1,3 l/ha		1	7	3	40/10*
I-cihalotrin 5	Kaiso Sorbie	0,15 kg/ha		1	14	3	30*
I-cihalotrin 10	Lambdastar	0,11 l/ha	1000	2	7	3	50

Notas: n° máximo aplicaciones por campaña **PS** Plazo de seguridad **G.Q.** grupo Químico. **Z.N.T.** Zona No Tratada al agua (Spe 3) Distancia en metros a los cauces de agua, (*) con boquillas de reducción de deriva ** consultar (1) Autorizados en Agricultura ecológica

Para mejorar la persistencia de los **piretroides** el pH del caldo debe estar a 6.

Más información: <https://estacionavisos.agrointegra.intiasa.es>