

RECOMENDACIONES INTIA. CAMPAÑA 2026

MOSCA DEL OLIVO - (*Bactrocera oleae*)

PARCHEO

El desarrollo óptimo de la mosca de la aceituna se produce cuando dispone de algo de humedad y temperaturas entre 20 y 30°C. El inicio del vuelo de la plaga tuvo lugar entre principios y mediados de julio según las zonas; estas capturas, así como los daños han ido en aumento lentamente y de forma muy diferente según zonas.

Ante esta situación se recomienda el **tratamiento en parcheo** sólo a las variedades **Arróniz, Negral/Gordal y Empeltre**. Esta recomendación **SOLO** va dirigida a las parcelas **que NO estén situadas** en la ladera de Montejurra en orientaciones sur y en la zona de la Ribera (de Cadreita-Valtierra hacia el sur).


- Actuaciones en las parcelas de la Ladera de Montejurra orientación sur: Ver Hoja informativa **Nº 97**
- Actuaciones en las parcelas de la Ribera (Cadreita-Valtierra hacia el Sur): no es momento de comenzar con ninguna estrategia de control.

En A. Ecológica debido a las características de los productos se puede iniciar el tratamiento a todo el árbol (los productos autorizados en la leyenda del cuadro).

La técnica del parcheo resulta eficaz si se realiza correctamente y permite reducir el gasto de producto.

Esta técnica consiste en **mezclar el insecticida con una proteína hidrolizada** que funciona como atrayente, esta mezcla se pulveriza con gota gruesa sobre los árboles. Existen dos opciones de parcheo de acuerdo al tipo de plantación:

- **Plantaciones tradicionales:** Tratar mojando una superficie de 1-3 m² (en función del tamaño de copa), en la cara sur de todos los árboles.
- **Plantaciones intensivas o superintensivas:** La aplicación en parcheo se puede hacer tratando desde el 25 % hasta el 50 % de la parcela, alternando filas tratadas con filas sin tratar como se muestra en la siguiente imagen.



Como el nivel de daños es variable de unas fincas a otras, es aconsejable **realizar observaciones** en cada parcela con el fin de evaluar el índice de daños y decidir si se trata o no. Se muestrearán entre 500 y 1.000 frutos a razón de 25-50 frutos por árbol.

NOTA 26. Agosto 2026

Con 1% de aceitunas picadas se aplicará un tratamiento a parcheo. A partir del 5% de aceitunas picadas el tratamiento será total.



Mosca de la aceituna



Larva de mosca en fruto



Picada de mosca

Los insecticidas aconsejados para la aplicación en parcheo se recogen en el cuadro siguiente:

Materia activa %	N. comercial	Dosis	Gasto Caldo	Nº A	G.Q.	Z.N.T
spinosad 0,024 (1)	Spintor cebo	1 l/ha	5-10 l/ha	4	5	5
cyantraniliprol 10	Exirel cebo	75-225 ml/ha	5-30 l/ha	3	28	5
deltametrin 10 (2)	Decis Expert	0,025 l/ha	20 l/ha	3	3	30
deltametrin 2,5	Deltaplan/Decis	0,03-0,05 %	20 l/ha	3	3	30
lambda-cihalotrin 1,5	Karate 1,5 CS	0,07 l /100 l	0,3 l/árb.	2	3	30
lambda-cihalotrin 1,5	KarateZeon+1,5 CS	0,05-0,13 %	0,1 l/árb.	1	3	40/10*

PROTEÍNAS HIDROLIZADAS						
prote. hidrolizada - 30	Biocebo/P.Hidro. Life					
prote. hidrolizada - 36	Flyral	1,25 %	0,5 l/árb.	1-3		
urea 17+p.hidroliz.50	Entomela 50	3 %	30 l/ha	6		
urea 25+p.hidroliz.75	Entomela 75 SL	3 %	30l/ha	6		

Notas: Nº A Número de aplicaciones por campaña G.Q. grupo Químico. Z.N.T. Zona No Tratada al agua, distancia en metros a los cauces de agua, (*) con boquillas de reducción de deriva.

(1) Autorizados en Agricultura ecológica. Para el tratamiento a todo el árbol están autorizados b. *bassiana* (Naturalis L) y caolín (Surround WP y Argical pro)

(2) Utilizar con 2,5% de proteínas hidrolizadas

Para mejorar la persistencia de los piretroides el pH del caldo estará a 6.

Más información: <https://estacionavisos.agointegra.intiasa.es>