Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente

Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

Servicio de Agricultura/ Nekazaritza zerbitzua
Sección de Ayudas a las Rentas/ Etekiterako Laguntzen Atala
C/ González Tablas, 9
31005 PAMPLONA - IRUÑA
Tlfno: 848424829.

RECOMENDACIONES INTIA OLIVOS. CAMPAÑA 2026

TRATAMIENTOS REPILO

Fusicladium oleagineum

En este final de verano las condiciones no han sido las adecuadas para el desarrollo de las infecciones. No obstante, si se producen lluvias unidas a las temperaturas ya suaves las condiciones serán favorables para las infecciones.



Síntomas de repilo

En sistemas de Agricultura Ecológica se deben priorizar los métodos de lucha preventivos. En el caso de nuevas plantaciones hay que optar por variedades menos sensibles a repilo y por un diseño y orientación que favorezcan la ventilación. La formación del árbol y el sistema de poda tienen que favorecer la aireación e iluminación de la vegetación.
Al realizar tratamientos con fungicidas autorizados en agricultura ecológica, hay que tener en cuenta, que son productos con acción por contacto, por lo que habrá que anticipar las aplicaciones a los momentos de riesgo de infección de la enfermedad.

Para valorar la necesidad de realizar tratamientos fungicidas, se recomienda realizar una prueba diagnóstica para detectar repilo latente o incubado (hojas infectadas por la enfermedad en las que todavía no se han hecho patentes los síntomas típicos). Para ello se toman hojas sin síntomas y se sumergen durante 20 minutos en una solución de sosa caustica al 5%, al cabo de ese tiempo se contabilizarán las hojas que muestran síntomas de repilo mostrándose la enfermedad en forma de manchas redondeadas de color negruzco.





Síntomas de repilo incubado o latente tras prueba diagnóstica

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua

Servicio de Agricultura/ Nekazaritza zerbitzua
Sección de Ayudas a las Rentas/ Etekiterako Laguntzen Atala
C/ González Tablas, 9
31005 PAMPLONA - IRUÑA
Tlfno: 848424829.

Atención al número de aplicaciones y momentos de aplicación de cada producto, se aconseja mirar bien el apartado de observaciones en los cuadros de productos a utilizar.

Los fungicidas recomendados en estos tratamientos de otoño, con presencia de aceitunas, son:

Materia activa %	Nombre. comercial	Dosis Max.	Observaciones
Bacillus subtilis 1,34	Serenade Aso	8 l/ha	1 a 6 aplicaciones **PS. No procede**
compuestos cupricos **(1)**	Varios	Varias	**OJO!** diferentes condiciones de uso **PS.14-15 (20) días**
dodina 40	Syllit Flow	1,7-2,25 l/ha	2 aplicaciones en primavera o en otoño **PS. 7 días**
dodina 54,4	Syllit Max	1,25-1,65 l/ha	2 aplicaciones en primavera o en otoño **PS. 7 días**
fosfonato potásico 51	Varios	1,2-2,5 l/ha	1 aplicación hasta inicio cambio de color fruto **PS. 15 días**
mefentrifluconazol 7,5	Revyona	2 l/ha	2 aplicaciones hasta maduración **PS. 21 días**
tebuconazol 3,6 + oxicloruro de cobre 36	Neptune	250 cc/hl	2 aplicaciones, una en prefloración **PS. 15 días**
trifloxistrobin 50	Flint	10 g/hl	2 aplicaciones, máximo una en otoño Máximo 120 g/ha y aplicación **PS. 14 días**

Autorizado en agricultura ecológica **(1)** **Atención,** los diversos formulados de cobre varían mucho en cuanto a dosis, número de aplicaciones, momentos de aplicación e incluso máximo de Cu metal por año, se debe consultar hoja de registro o etiqueta de cada formulado.

Más información: https://estacionavisos.agrointegra.intiasa.es

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua

Servicio de Agricultura/ Nekazaritza zerbitzua
Sección de Ayudas a las Rentas/ Etekiterako Laguntzen Atala
C/ González Tablas, 9
31005 PAMPLONA - IRUÑA
Tlfno: 848424829.

RECOMENDACIONES INTIA OLIVOS. CAMPAÑA 2026

MOSCA DE LA ACEITUNA

Bactrocera oleae

ZONA MEDIA



En los últimos días se ha observado como la actividad de la mosca va en aumento, tanto en lo referente a moscas capturadas como a daños.

Se recomienda la realización de un tratamiento en las parcelas ubicadas en la Zona Media en las variedades Arroniz, Negral/Gordal y Empeltre.

En las variedades Arbequina y otras de bajo calibre la recomendación es no realizar ningún tratamiento.

Se recuerda que los daños son muy variables de unas parcelas a otras, por lo que se recomienda realizar observaciones en cada parcela con el fin de evaluar el índice de daños y decidir si se trata. Se muestrearán entre 500 y 1.000 frutos a razón de 25-50 frutos por árbol. A partir del 5% de aceitunas picadas se recomienda el tratamiento total de la parcela.

Estos son los insecticidas aconsejados con los plazos de seguridad de cada uno de ellos. Es importante utilizar los piretroides de forma moderada ya que además de resistencias, aumentan los problemas de acariosis en las parcelas.

Materia activa %	N. comercial	Dosis producto	Vol Caldo l/ha	Nº A	PS	G.Q.	Z.N.T
acetamiprid 20	Epik	0,3 kg/ha	450	2	28	4A	40
acetamiprid 20	Acemur SP	0,3 kg/ha	500-100	1	28	4A	20*
b. bassiana 2,3 (1)	Naturalis L	1-2 l/ha	800-1600	3-5	NP	UNF	5
caolín 95 (1)	Surround WP	30 kg/ha		1	NP		5
caolín 99 (1)	Argical pro	30 kg/ha	500-1000	6	28		5
cipermetrin 5	Cythrin 50 EC	0,8-1,0 l/ha	800-1200	2	3	3	50/20*
deltametrin 1,57	Meteor	0,08-0,09%		3	7	3	20/10*
deltametrin 2,5	Varias - consultar	0,03-0,05 %		3	7	3	**
flupiradifurona 20 **(2)**	Sivanto Prime	0,5-0,75 l/ha	800-100	1	14	4D	20
l-cihalotrin 1,5	KarateZeon+1,5 CS	1,3 l/ha		1	7	3	40/10*
l-cihalotrin 5	Kaiso Sorbie	0,15 kg/ha		1	14	3	30*
l-cihalotrin 10	Lambdastar	0,11 l/ha	1000	2	7	3	50

NOTAS: Nº A: nº máximo de aplicaciones por campaña **PS** Plazo de seguridad **G.Q.:** Grupo Químico **Z.N.T.:** Zona No Trata al agua (Spe 3) Distancia en metros a los cauces de agua, (*) con boquillas de reducción de deriva (**) consultar. **(1)** Autorizados en agricultura ecológica. **(2)** con bajo nivel de daños.

Para mejorar la persistencia de los piretroides el pH del caldo debe estar a 6.

Más información: https://estacionavisos.agrointegra.intiasa.es

NOTA 28. Septiembre 2026

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua

Servicio de Agricultura/ Nekazaritza zerbitzua
Sección de Ayudas a las Rentas/ Etekiterako Laguntzen Atala
C/ González Tablas, 9
31005 PAMPLONA - IRUÑA
Tlfno: 848424829.

RECOMENDACIONES INTIA OLIVOS. CAMPAÑA 2026

MOSCA DE LA ACEITUNA

Bactrocera oleae

RIBERA



En los últimos días se ha observado como la actividad de la mosca va en aumento, tanto en lo referente a moscas capturadas como a daños.

Se recomienda la realización de un tratamiento en las parcelas ubicadas en la Rivera en las variedades Arroniz, Negral/Gordal y Empeltre.

En las variedades Arbequina y otras de bajo calibre la recomendación es no realizar ningún tratamiento.

Se recuerda que los daños son muy variables de unas parcelas a otras, por lo que se recomienda realizar observaciones en cada parcela con el fin de evaluar el índice de daños y decidir si se trata. Se muestrearán entre 500 y 1.000 frutos a razón de 25-50 frutos por árbol. A partir del 5% de aceitunas picadas se recomienda el tratamiento total de la parcela.

Estos son los insecticidas aconsejados con los plazos de seguridad de cada uno de ellos. Es importante utilizar los piretroides de forma moderada ya que además de resistencias, aumentan los problemas de acariosis en las parcelas.

Materia activa %	N. comercial	Dosis producto	Vol Caldo l/ha	Nº A	PS	G.Q.	Z.N.T
acetamiprid 20	Epik	0,3 kg/ha	450	2	28	4A	40
acetamiprid 20	Acemur SP	0,3 kg/ha	500-100	1	28	4A	20*
b. bassiana 2,3 (1)	Naturalis L	1-2 l/ha	800-1600	3-5	NP	UNF	5
caolín 95 (1)	Surround WP	30 kg/ha		1	NP		5
caolín 99 (1)	Argical pro	30 kg/ha	500-1000	6	28		5
cipermetrin 5	Cythrin 50 EC	0,8-1,0 l/ha	800-1200	2	3	3	50/20*
deltametrin 1,57	Meteor	0,08-0,09%		3	7	3	20/10*
deltametrin 2,5	Varias - consultar	0,03-0,05 %		3	7	3	**
flupiradifurona 20 **(2)**	Sivanto Prime	0,5-0,75 l/ha	800-100	1	14	4D	20
l-cihalotrin 1,5	KarateZeon+1,5 CS	1,3 l/ha		1	7	3	40/10*
l-cihalotrin 5	Kaiso Sorbie	0,15 kg/ha		1	14	3	30*
l-cihalotrin 10	Lambdastar	0,11 l/ha	1000	2	7	3	50

NOTAS: Nº A: nº máximo de aplicaciones por campaña **PS** Plazo de seguridad **G.Q.:** Grupo Químico **Z.N.T.:** Zona No Trata al agua (Spe 3) Distancia en metros a los cauces de agua, (*) con boquillas de reducción de deriva (**) consultar. **(1)** Autorizados en agricultura ecológica. **(2)** con bajo nivel de daños.

Para mejorar la persistencia de los piretroides el pH del caldo debe estar a 6.

Más información: https://estacionavisos.agrointegra.intiasa.es

NOTA 28. Septiembre 2026